

Robaxacet^{MD} Extra Fort

Acétaminophène + Méthocarbamol

Ces renseignements thérapeutiques sont les plus récents; ils peuvent différer de ceux qui figurent sur les étiquettes des emballages des produits. En cas de différence entre l'étiquette du produit et le contenu du présent site Web, ce dernier doit être considéré comme le plus à jour.

Info-médicament

Ingrédients actifs (dans chaque caplet)

Utilités

500 mg d'acétaminophène (extra fort)	Analgésique
400 mg de méthocarbamol.....	Relaxant musculaire

Usages • Pour le soulagement temporaire des douleurs associées aux spasmes musculaires telles que ■ les maux de dos ■ la tension dans les muscles du cou ■ les entorses et les foulures.

Mises en garde **Avertissement – foie** L'acétaminophène peut causer **des dommages sévères au foie qui peuvent être mortels** si vous • prenez une quantité supérieure à la dose recommandée en 24 heures • le prenez en même temps que d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène • consommez 3 boissons alcoolisées ou plus chaque jour. Symptômes possibles de dommages au foie : • jaunissement de la peau ou des yeux • urines foncées • transpiration • nausées • vomissements • maux d'estomac • fatigue inhabituelle • perte d'appétit.

Alerte aux allergies L'acétaminophène peut provoquer des réactions cutanées graves. Cessez de prendre ce produit et consultez un médecin immédiatement si l'un ou l'autre de ces symptômes apparaît : • rougeur de la peau • cloques • éruption cutanée. **Si l'un ou l'autre de ces symptômes apparaît, cessez de prendre ce produit et consultez un médecin immédiatement.**

Ne pas utiliser • avec d'autres médicaments renfermant de l'acétaminophène ou méthocarbamol • si vous êtes allergique à l'acétaminophène. Si vous ne savez pas si votre médicament renferme de l'acétaminophène, consultez un médecin ou un pharmacien.

Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous • avez une maladie du foie ou des reins • prenez de la warfarine (un médicament qui éclaircit le sang) • prenez ■ des médicaments contre la dépression ■ des sédatifs ■ tout autre médicament • êtes enceinte ou allaitez.

Lorsque vous utilisez ce produit • vous pourriez souffrir de somnolence, d'étourdissements, de nausées ou de vertiges • ne conduisez pas, ne faites pas fonctionner de machines • ne buvez pas d'alcool.

Cessez d'utiliser et consultez un médecin si • les symptômes s'aggravent ou la douleur persiste pendant plus de 5 jours • des symptômes inhabituels se manifestent • une éruption cutanée ou des démangeaisons se manifestent.



Garder hors de la portée des enfants. Cet emballage contient suffisamment de médicament pour nuire gravement à un enfant. En cas de surdose, appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Il est essentiel de consulter sans tarder, même en l'absence de signes et de symptômes.

Mode d'emploi Adultes et enfants de 12 ans et plus : •Prendre 2 caplets toutes les 6 heures
•Ne pas prendre plus de 8 caplets en 24 heures. Ne pas prendre plus que la dose indiquée (voir le risque pour le foie). À n'utiliser que sur recommandation d'un médecin.

Autres renseignements Conserver à la température ambiante (15-30 °C).

Ingrédients inactifs Acide stéarique, amidon de maïs, amidon prégélatinisé, bleu n° 1 FD&C, crospovidone, dioxyde de silicium, glycolate d'amidon sodique, hypromellose, jaune n° 10 D&C, laurylsulfate de sodium, méthylcellulose, polyéthylèneglycol, povidone, stéarate de magnésium.

Questions? 1-888-275-9938 www.robax.ca